NOTE X.

DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES HÉTÉROMÈRES DE L'ILE DE SALEYER

PAR

L. FAIRMAIRE.

Les Coléoptères décrits dans cette »Note" sont rapportés de l'île de Saleyer (située au sud de Celebes) par M. H. E. D. Engelhard, qui a eu la bienveillance de les offrir, avec bon nombre d'autres, au Musée Royal d'hist. nat. à Leyde.

Tenebrionidae.

Notioscythis, n. g.

L'insecte pour lequel il me parait nécessaire de créer un genre spécial, ressemble assez aux *Scythis* par la forme des yeux, du labre et du mésosternum; mais le corps est plus déprimé, le chaperon est largement arrondi de chaque côté, à peine obtusément angulé au milieu du bord antérieur, les mandibules sont plus cachées à la base, le dessous de la tête est plus profondément sillonné en travers le menton a la forme d'un carré transversal, le dernier article des palpes maxillaires est un peu moins large; le corselet est tranchant sur les côtés, l'écusson moins ponctiforme, tronqué; le bord réfléchi des élytres est plus aplani, la saillie intercoxale de l'abdomen est plus étroite, les deux éperons des tibias antérieurs sont subégaux, bien plus petits.

1. *Notioscythis punctoseriata*, n. sp.

Long. 9 millim. — Oblonga, parum convexa, nigra, modice nitida; capite prothoraceque densissime sat tenuiter punctatis; capite supra oculos tenuiter plicato, utrinque leviter oblonge impresso; antennis crassiusculis, brevibus, medium prothoracis vix superantibus, articulis 1° 2°que subæqualibus, 3° paulo longiore, ceteris æqualibus, ultimis paulo picescentibus, 11° minore; prothorace transverso, elytris angustiore, postice angustato, lateribus antice rotundatis, basi sinuatis, angulis posticis acutis; scutello brevi, truncato; elytris ovato-oblongis, basi truncatis, a medio leviter attenuatis, apice obtuse acuminatis, basi obsolete marginatis, dorso punctato-lineatis, lineis suturam versus fere striatis, intervallis planis, subtiliter punctatis, intervallo suturali magis fortiter ad lineam punctato; subtus dense sat tenuiter punctata.

Scleroides, n. g.

L'insecte sur lequel est établi ce nouveau genre ressemble beaucoup aux *Sclerum*; il a, comme eux, le dernier article des palpes maxillaires sécuriforme, le repli épipleural des élytres entier, le corps ailé et le bord antérieur du chaperon échancré; les yeux sont à peine entamés par les joues, les antennes sont assez grêles et assez courtes, les articles 8—10 un peu transversaux, le dernier plus grand, obtusément arrondi, mais les tibias antérieurs sont faiblement élargis vers l'extrémité, finement spinuleux en dehors comme chez les *Opatrum* qui s'éloignent par la conformation du repli des élytres. Le prosternum est tronqué, le mésosternum oblique et faiblement concave, la saillie intercoxale assez large, obtusément tronquée, les éperons des tarses sont à peine distincts. Si le repli des élytres n'était pas entier, si les yeux étaient partagés, si le corps était aptère et les tibias antérieurs moins spinuleux, la place de cet insecte serait près des *Phylax*.

2. *Scleroides pluricostatus*, n. sp.

Long. 6 millim. — Oblongus, subparallelus, parum convexus, fusco-brunneus, opacus, setulis ferrugineis tenuibus parum dense vestitus; capite tenuiter dense asperato, basi granulato, clypei margine antico sat fortiter exciso; prothorace medio elytris haud angustiore, antice paulo quam basi angustiore, lateribus rotundato et sat late explanato, nullo modo crenulato, margine postico utrinque sat fortiter sinuato, angulis posticis sat acutis, dorso aspero-granulato, medio obsolete lineato; scutello obtuse triangulari; elytris apice conjunctim rotundatis, sutura et utrinque costis 3 convexis, interstitiis biseriatim crenato-substriatis, punctis vix impressis, intervallis serierum paulo elevato; subtus asperulus.

Le facies de cet insecte est celui du *Scleron denticolle* Fairm., de Sumatra, mais les tibias antérieurs et le corselet sont fort différents.

Brachyidium, n. g.

Corpus ovatum, modice convexum, alatum. Clypeus emarginatus, oculi divisi. Palpi maxillares articulo ultimo securiformi. Tibiæ anticæ ad apicem dilatatæ, extus denticulatæ, calcaribus minutis. Elytra margine reflexo integro. Antennæ breves, medium prothoracis vix attingentes, basi sat graciles, apice gradatim latiores, articulis 5 ultimis leviter transversis.

Ce genre, qui offre le facies d'un *Halonomus* et surtout d'un petit *Opatrum*, forme la transition des Sclérides aux Opatrides; ses tibias antérieurs, élargis à l'extrémité, ont une impression pour recevoir le tarse, la tranche externe

est finement denticulée avec une dent plus forte avant le milieu; le prosternum s'élargit derrière les hanches, le mésosternum est oblique, assez large, un peu concave à la base pour recevoir la pointe obtuse du prosternum; la saillie intercoxale est assez large, obtuse, le 5e segment de l'abdomen est court, sinué de chaque côté.

3. *Brachyidium breviusculum*, n. sp.

Long. 6 millim. — Ovatum, modice convexum, fuscum, subopacum, setulis ferrugineis brevibus sat dense vestitum; capite rugoso-punctato, antice obsolete arcuatim impresso; prothorace elytris vix sensim angustiore, longitudine plus duplo latiore, antice angustato, lateribus antice rotundato, angulis anticis obtuse rotundis, margine postico late ac fortiter bisinuato, angulis posticis acute retroversis, dorso dense parum profunde aspero-punctato; scutello fulvescente, brevi, lato, obtuse angulato, nitidulo; elytris subovatis, apice angustatis et obtusis, basi ad scutellum oblique plicatis, plica angusta, tenui, dorso sat tenuiter striatis, striis integris, tenuiter punctatis, intervallis planiusculis, dense tenuiter rugatulis; subtus paulo nitidius, asperatum.

4. *Ceropria dolorosa*, n. sp.

Long. 8 millim. — Oblongo-ovata, modice convexa, nitida, fusco-nigra, vix sensim metallescens, subtus fere opaca, tarsis antennisque obscure piceis; capite inter oculos subtiliter sat dense punctato, ante oculos utrinque sat profunde foveolato, inter antennas sulcato; antennis brevibus, articulis 4—10 aequalibus, triangularibus, punctatis, 11o obtuse rotundato; prothorace elytris paulo angustiore, longitudine duplo latiore, lateribus marginatis, antice cum angulis rotundatis, margine postico utrinque late sinuato, medio recto, dorso subtilissime sat dense punctulato, basi utrinque impressione brevi, oblonga, interdum obliqua signato; scutello late ogivali, laevi; elytris tenuiter striatis,

striis subtiliter punctatis, intervallis vix convexiusculis, obsoletissime punctulatis; subtus laevis, prosterno apice fere recte angulato, planato, utrinque tenuiter striato.

Ressemble un peu à la *C. induta* Wiedem., mais bien différente par la coloration sombre, la taille plus petite, les élytres plus courtes, à stries plus fines, plus finement ponctuées avec les intervalles plus plans.

5. *Derosphaerus interstitialis*, n. sp.

Long. $12^1/_2$ millim. — Oblongus, convexus, niger, modice nitidus, capite prothoraceque paulo minus nitidis, capite vix perspicue punctulato, antice sulco apice recto, utrinque obliquato signato; antennis brevibus, basin prothoracis haud attingentibus, apice cinereo-pubescentibus; prothorace elytris angustiore, transverso, lateribus cum angulis anticis rotundato, basi valde marginato, angulis posticis minutis, acutiusculis, dorso tenuiter densissime punctulato, utrinque tenuiter marginato; scutello breviusculo, triangulari, lateribus arcuatis, tenuiter punctato; elytris post medium leviter attenuatis, sat fortiter crenato-striatis, postice haud obsolescentibus; intervallis convexis, subtiliter punctulatis et vage transversim cicatricosis; subtus subtilissime punctulatus, abdomine basi sat tenuiter strigosulo-punctato; femoribus leviter clavatis, tibiis apice extremo tarsisque subtus pallide fulvo-sericeis.

Ressemble beaucoup au *D. globicollis* Thoms., mais un peu plus étroit avec le corselet notablement plus court, plus arrondi sur les côtés, à ponctuation bien plus marquée, finement rugueuse, les stries des élytres moins grossement ponctuées, les intervalles un peu en forme de toit, très ponctués, presque ruguleux; les antennes sont aussi plus courtes avec les derniers articles transversaux.

6. *Lyprops forticornis*, n. sp.

Long. 9 millim. — Oblongus, postice haud sensim amplia-

tus, vix convexus, fuscus, sat nitidus, palpis pedibusque piceis; supra fortiter ac dense punctatus, capite magis rugoso, inter antennas transversim impresso; antennis crassis, articulis subquadratis, articulo ultimo ovato; prothorace transverso, medio elytris haud angustiore, basi et antice æqualiter angustato, lateribus valde rotundatis, basi breviter sinuatis, angulis posticis acute rectis, anticis obtusis, margine postico utrinque obliquato, medio linea longitudinali elevata signato; scutello late triangulari, parce punctato; elytris regulariter dense punctatis, apice conjunctim obtusis, vix rotundatis; subtus fusco-piceus, pectore lateribus grosse punctato, abdomine tenuius punctato.

Cet insecte ressemble plus à un *Anœdus* qu'à un *Lyprops*; il se distingue du *picinus* Fairm., de Sumatra, par les antennes bien plus épaisses, le corselet nullement denticulé sur les bords, ayant au milieu une ligne élevée et les angles postérieurs pointus, par l'écusson plus triangulaire et les élytres régulièrement ponctuées, nullement striolées; le corps est plus petit et peut-être encore moins convexe, la ponctuation du corselet est bien moins grosse.

Bradynocerus, n. g.

Corpus oblongum, longitudinaliter arcuatum. Epistoma insertionem antennarum superans. Caput subtus transversim impressum; labrum haud aut vix epistoma superans; mentum antice attenuatum. Oculi a prothorace distantes, reniformes. Mandibulæ apice integro. Antennæ breves, medium prothoracis haud attingentes, articulis 6 primis subæqualibus, 1° 3°que paulo longioribus, 5 ultimis compressis, dilatatis, ultimo apice rotundato. Prothorax lateribus integer, angulis anticis productis, acutis. Elytra haud connata. Mesosternum furcatum, prosternum apice angulatum. Tibiæ muticae, tarsi subtus pilosi.

La place de ce nouveau genre me parait être dans les Cnodalonides, entre les *Tetraphyllus* et les *Camaria*; mais le métasternum est peu allongé, le labre ne dépasse

guère l'épistome et est parfois retracté, et les antennes sont très courtes. La forme générale est plutôt celle des Ténébrionides, avec des élytres fortement striées.

7. *Bradynocerus aulacopterus*, n. sp.

Long. $10^1/_2$ à 13 millim. — Oblongum, subellipticum, convexum, nigrum, subcyanescens, nitidum; caput tenuiter densissime rugosulo, antice arcuatim impresso, margine antico fere recto, utrinque rotundato; prothorace transverso, elytris paulo angustiore, lateribus fere rectis, antice leviter arcuatis, marginatis, angulis anticis productis, acutis, basi marginato, utrinque late sinuato, angulis posticis acute rectis, dorso fortiter sat dense punctato, lateribus fere strigoso, medio plagulis minutis lævioribus; scutello ogivali, lævi; elytris a medio postice declivibus, apice obtusis, profunde punctato-sulcatis, intervallis convexiusculis, subtiliter punctulatis, post medium elevatis et alternatim acute costatis, punctis striarum post medium obsolescentibus, ad latera profundis; subtus minus nitidus, prosterno grosse ac fortiter punctato, metasterno et abdomine minus fortiter punctatis; mesosterno antice tenuiter rugoso, medio carinulato.

La forme de cet insecte rappelle assez bien, mais en petit, celle du *Nyctobates canaliculatis* Eschsch., avec des antennes plus courtes, les angles du corselet très pointus et le corps arqué longitudinalement.

8. *Dietysus modestus*, n. sp.

Long. $6^1/_2$ millim. — Oblongo-ellipticus, valde convexus, fuscus, valde nitidus, leviter ænescens; capite verticali, magis metallico, dense tenuiter punctato, inter antennas sulco transverso, utrinque abbreviato, impresso; epistomate labroque anguste fulvo-marginatis; tarsis, palpis antennisque piceis, his apice paulo crassioribus; prothorace elytris paulo angustiore, transverso, antice a basi attenuato, lateribus leviter arcuatis, margine postico utrinque obsoletissime sinuato, dorso tenuiter sat dense punctato, margine postico angustissime lævi, utrinque puncto impresso; scutello tri-

angulari, lævi; elytris oblongo-ovatis, apice conjunctim obtuso-rotundatis, lateribus valde declivibus, striato-punctatis, striis parum profundis, integris, intervallis planiusculis, subtilissime punctulatis; subtus lævis, abdomine subtiliter punctato.

Diffère des autres *Dietysus* par la forme elliptique, plus convexe, les élytres verticales latéralement; la tête est aussi plus inclinée en dessous, les antennes sont moins longues, n'atteignant pas le milieu du corps et leur 4e article est égal au 5e.

Cistelidae.

9. *Cistela densepunctata*, n. sp.

Long. 4 à 5 millim. — Oblongo-ovata, sat convexa, testaceo-castanescens, sat nitida, capite prothoraceque interdum paulo obscurioribus, fulvo-villosa, subhispida, antennis fuscis, basi testaceis; capite dense punctato, inter oculos transversim profunde sulcato, oculis nigris, valde prominulis; antennis medium corporis haud attingentibus, articulo 2° minuto, 3° ceteris longiore, gracili, 4° - 10° subæqualibus, crassioribus, obconicis, 11° ovato; prothorace basi elytris haud angustiore, brevi, a basi antice angustato, lateribus leviter arcuatis, antice cum angulis rotundatis, margine postico utrinque sat fortiter sinuato, angulis posticis acutiusculis, dorso dense punctato; scutello triangulari, haud sensim punctato; elytris ovato-oblongis, basi truncatis, medio vix sensim ampliatis, apice obtusis, dense punctato-lineatis et utrinque lineis 7—8 anguste lævibus et subelevatis, suturam versus et extus bistriatis; subtus punctata, tarsis articulo penultimo lato integro, laminato, tarsis intermediis articulo 4° et posticis articulo 3° brevissimo, subtus breviter producto.

Ressemble assez à la *C. (Isomira) murina* Linn., mais plus courte, bien plus ponctuée, et avec le pénultième article des tarses laminé.

Monommidae.

10. *Monomma splendidulum*, n. sp.

Long. 4½ millim. — Ovatum, postice attenuatum, convexum, fusco-æneum, nitidum, capite obscuro, prothorace lateribus et antice paulo picescente, subtus fuscum, minus nitidus, ore, antennis, pedibus elytrorumque margine reflexo castaneo-piceis; capite convexiusculo, densissime punctato, antice fere truncato; antennis brevibus; prothorace trapeziformi, lateribus vix arcuatis, subtiliter sat dense punctato; scutello parvo, punctulato; elytris ante medium postice attenuatis, striatis, striis parum profundis sed sat fortiter punctatis, apicem versus paulo minus impressis, intervallis planis, subtilissime vix perspicue punctulatis, margine externo sat lato; metasterno lateribus strigoso.

Diffère du *M. Raffrayi* Thoms., de Java, par sa taille un peu moindre, sa coloration un peu métallique, et les stries des élytres entières, à peine plus faibles en arrière, ponctuées médiocrement et également.

Lagriidae.

11. *Nemostira crenatostriata*, n. sp.

Long. 8 millim. — Elongata sat convexa, fulvo-flava, nitida; capite inter oculos vix obscuriore, inter antennas profunde transversim impresso, fronte inter oculos punctis 2 grossis signato; antennarum articulo ultimo præcedentibus 3 conjunctis æquali, leviter arcuato; prothorace ovato, capite haud angustiore, lateribus antice arcuatis, angulis anticis rotundatis, ante basin leviter sinuatis, margine postico elevato, intus sulcato, angulis posticis acutis, dorso parum dense punctato, antice fere laevi; scutello quadrato-rotundato, puncto impresso; elytris oblongo-elongatis, prothoracis basi fere duplo latioribus, postice leviter ampliatis, apice conjunctim obtusis, profunde crenato-striatis, punctis apice obsolescentibus, intervallis convexis, læviusculis, 3° post medium punctis 4 signato; subtus lævis, metasterno lateribus fortiter punctato.

Diffère des deux espèces de Sumatra (*uncipennis* Fairm. et *truncata* Fairm.) par la taille bien plus petite et la terminaison des élytres qui est simplement obtuse; leur surface offre des poils hérissés fins et très épars.

Oedemeridae.

12. *Ananca quadripunctulata*, n. sp.

Long. 11 millim. — Elongata, sat convexa, flava, nitida, elytris utrinque punctis 2 minutis, fuscis, 1° ante, 2° post medium signatis; capite inter oculos late parum fortiter impresso et obsolete punctulato; prothorace ovato, postice constricto, lateribus antice fere angulatim rotundatis, basi sat fortiter sinuatis, angulis posticis extus productis, margine postico elevato, dorso subtilissime dense punctato, medio postice impresso, antice obsolete subcarinato; scutello triangulari-obtuso, obsolete punctato; elytris apice obtuse acuminatis, subtilissime dense punctulatis, sutura et utrinque costulis 2 angustis paulo elevatis, apice obsoletis.

Cette espèce ressemble à l'*A. maritima* Coquer., de Madagascar; mais outre la coloration, qui est d'un beau jaune avec 4 petits points bruns sur les élytres, le corselet n'est pas uni, ayant une impression au milieu de la base, et les nervures des élytres sont plus distinctes.

Paris, 17 Décembre 1882.